



# Инструкция к препарату Кондилин (Кондилокс, Подофиллотоксин) раствор 0,5% (5 мг/мл) 3.5 мл

[Узнать цену >>>](#)

---

## Состав и форма выпуска

Раствор для наружного применения 0.5% бесцветный, прозрачный.

1 мл содержит: подофиллотоксин 5 мг.

*Вспомогательные вещества:* молочная кислота - 51.67 мг, натрия лактат - 7.79 мг, этанол - 735 мг, вода очищенная - 30.6 мг.

## Фармакологическое действие

Средство с прижигающим и мумифицирующим действием. Представляет собой компонент подофиллина, получаемого из экстракта корней растения подофилла. Оказывает цитостатическое действие, уменьшает выраженность воспалительных реакций. При местном применении вызывает некроз остроконечных кондилом.

## Показания препарата Кондилин

Остроконечные кондиломы.

## Режим дозирования

Способ применения и режим дозирования конкретного препарата зависят от его формы выпуска и других факторов. Оптимальный режим дозирования определяет врач. Следует строго соблюдать соответствие используемой лекарственной формы конкретного препарата показаниям к применению и режиму дозирования.

Применяют наружно (в соответствии с инструкцией) 2 раза/сут с интервалом 12 ч в течение 3 дней ежедневно. Лечение следует продолжать до исчезновения кондиломы, но не более 5 недель.

## Побочное действие

Возможно: покраснение, болезненность, изъязвления эпителиального покрова кондиломы (обычно в начале лечения, чаще на 2-3 день применения).

При наличии больших кондилом в препуциальной области возможно развитие отека и баланопостита.

## Противопоказания к применению

Детский возраст, одновременное лечение препаратами, содержащими подофиллин, беременность, лактация, повышенная чувствительность к подофиллину.

## **Применение при беременности и кормлении грудью**

Противопоказан при беременности, в период лактации.

## **Применение у детей**

Противопоказан в детском возрасте.

## **Взаимодействие**

Не описано.

## **Передозировка**

*Лечение:* при местном применении больших доз препарата его следует смыть водой с мылом. При случайном приеме Кондилина® внутрь необходимо промыть желудок, контролировать электролитный, газовый баланс, картину периферической крови, функциональное состояние печени.

## **Меры предосторожности**

Следует использовать совершенно сухой аппликатор. Необходимо избегать попадания препарата на здоровую кожу и слизистые оболочки, окружающие кондилому, особенно в области крайней плоти. Рекомендуется перед аппликацией использовать для защиты кожи и слизистой оболочки вокруг кондиломы защитные мази, нейтральные кремы, вазелин, цинковую мазь. Применение на больших площадях (более 10 см<sup>2</sup>) может привести к реакциям, связанным с резорбтивным действием подофиллотоксина.

## **Особые указания**

Кондилилин необходимо применять с осторожностью. При попадании препарата в глаза во избежание выраженного раздражения необходимо срочно промыть глаза большим количеством воды.

Перед применением Кондилина® следует вымыть пораженные участки с мылом и водой и хорошо просушить.

При использовании Кондилина следует избегать его попадания на здоровую кожу и слизистые оболочки, окружающие кондилому. Особенную осторожность следует проявлять при локализации кондилом в области крайней плоти.

Раздражение, изъязвление кожи и слизистой вокруг кондиломы можно предотвратить при помощи защитных мазей, нейтральных кремов, вазелина, цинковой мази, которые наносят

на окружающие кондиломы ткани перед аппликацией Кондилина®.

При развитии отека и баланопостита возможно применение противовоспалительных препаратов (например глюкокортикоидов в форме мази).

Нанесение препарата на большую поверхность (>10 см<sup>2</sup>) может привести к реакциям, связанным с резорбтивным действием подофиллотоксина.

Целесообразно обследование и, в случае необходимости, лечение половых партнеров. Во время лечения следует исключить половые контакты либо предусмотреть использование в этот период барьерных контрацептивов.

## **Условия хранения**

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

## **Срок годности**

4 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.