

Состав и форма выпуска

Капсулы, в упаковке 40 штук.

1 капсула Келтика Форте содержит:

Активные вещества:

- 50 мг Уридин 5-монофосфат, динатриевая соль
- 0,003 мг цианокобаламин
- 0,4 мг фолиевой кислоты

Вспомогательные вещества: кислота лимонная, натрия цитрата дигидрат, магния стеарат, кремния диоксид коллоидный (аэросил 200), маннитол.

Желатиновая капсула: железа оксид черный (E 172), титана диоксид (E 171), индигокармин (E 132), желатин.

Фармакотерапевтическая группа

Препараты для лечения заболеваний нервной системы другие. Прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы.

Фармакологические свойства

Келтикан Форте является комбинацией двух нуклеотидов - цитидинмонофосфата и уридинмонофосфата. Эти нуклеотиды присутствуют в организме, поэтому не представляется возможным провести типичное фармакокинетическое исследование.

Фармакодинамика

Келтикан Форте обеспечивает организм фосфатными группами, необходимыми для объединения моносахаридов с кераминами для формирования нервных оболочек, и фосфатидными кислотами, составляющими сфингомиелин и глицерофосфолипиды - основные компоненты миелиновой оболочки. Таким образом, обеспечивается устойчивый трофический эффект, более полное созревание и регенерация аксональных нервных волокон. В результате чего уменьшается воспаление и нормализуется чувствительность поврежденного участка аксона, что способствует восстановлению аксонального транспорта.

Показания к применению

- радикулиты (люмбаго, люмбалгия, люмбоишиалгия)
- диабетическая полиневропатия
- алкогольные полиневриты
- опоясывающий лишай, ганглионит
- воспаление тройничного нерва, невралгия лицевого, тройничного, межреберных нервов
- плекситы.

Способ применения и дозы

Келтикан капсулы принимают перорально.

Взрослые: по 1 капсуле 1 раз в сутки. Келтикан Форте можно принимать до или после приема пищи. Рекомендованная продолжительность курса лечения — не менее 10 дней. При необходимости прием капсул может быть продолжен на 20 дней, если врач считает это необходимым.

Побочные действия

Не было описано.

Возможно проявление аллергических реакций, в случае проявления каких-либо нежелательных явлений, следует приостановить прием и обязательно обратиться к врачу.

Противопоказания

- повышенная чувствительность к препарату
- детский возраст до 18 лет

Лекарственные взаимодействия

Не установлено.

Беременность и период лактации

Применение препарата в период беременности и лактации не противопоказано, но целесообразность приема и дозу лекарственного средства устанавливает врач, в зависимости от преимущества пользы от применения над потенциальным риском для плода/ребенка.

Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами

Келтикан Форте не оказывает влияния на способность к управлению транспортными средствами и выполнения работ, связанных с необходимостью концентрации внимания.

Передозировка

В связи с низкой токсичностью препарата передозировка маловероятна.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок хранения

2 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

По рецепту.